

Différentes des fractures tirées de mon Cabinet

1
fracture oblique femur gauche, fracture oblique à la partie moyenne inférieure. Canal de la moelle ouvert dans l'apice supérieure de devant on arrive prolongement en pointe de cette pice à la partie antérieure. la malade qui étoit d'un bel âge mourut le jour même de la fracture. C'est pour quoi les bords et angles de cette fracture sont partout arrivés.

I chevauchement femur gauche, fracture à la partie moyenne supérieure. Calus, chevauchement le bout supérieur de l'apice d'en bas, passe derrière le bout inférieur de l'apice d'en haut. le chevauchement est de 14 lignes dont une pice anti-lige sur l'autre, dans celle position le bout inférieur de l'apice d'en haut débordé un peu en dedans du côté externe. l'apice d'en bas il s'est aplati et un peu élargi à partir du côté externe jusqu'au côté interne et on suite s'est courbé vers le bassin. Ce qui fait que du condyle interne de femur à la tête et os fait un arc à son côté interne.

Calus. les deux bouts fracturés de cet os sont arrondis l'un et l'autre amenés à leur extrémités respectives, on remarque entre l'un et l'autre inférieurement ^{et en dedans une fossette ou} un cal de forme ovale dans lequel sont les embouchures de 6 canaux. entre l'un et l'autre supérieurement et on arrive un autre cal de forme ovale au fond duquel sont encore ^{les} embouchures de 6 canaux. tous ces canaux sont sans doute autant de passages pour des vaisseaux qui pénétroient dans l'épaisseur du calus. au surplus le calus à l'extérieur lisse et lisse comme le reste du corps de l'os.

fracture en travers 2 chevauchement. femur droit. fracturé à la partie moyenne inférieure. Calus, chevauchement. le bout supérieur de l'apice d'en bas passe derrière le bout inférieur de l'apice d'en haut, le chevauchement est



de 26 lignes, dont une des pièces anti-apie sur l'autre, le bout
 Supérieur de la pièce d'en bas est arrondi, le bout ^{inférieur} Supérieur de la pièce
 d'en haut est terminé en bec de flûte, et un peu pointue. Cette extrémité
 pointue ^{porte a fauf} excède le Calus d'un pouce, elle est élevée de 14 lignes en avant
 de la pièce inférieure.

Le Calus ou la soudure n'a que 13 lignes de long, quoique le
 chevauchement soit de 26. parce qu'une partie de l'chevauchement
 porte a fauf comme on l'a dit le qui produiroit une langue
 engagée dans le chais; il n'y a point ici de cul de poche en haut
 non plus qu'en bas de la Cal. mais il y a quelques trous forts
 sensibles en bas et sur le côté d'ailleurs il est très
 ferme d'un blanc gris et non poreux ^{en qu'il ressemble peu} à l'anti que le reste de la
 partie moyenne de l'os. au dessus de la Cal en arrière il y a
 une épine morbifique osseuse, quelques petites à son côté interne
 du reste le fémur n'est point arqué comme le précédent.

3 chevauchement Corps d'un fémur gauche, fracturé à la partie moyenne
 inférieure; Calus chevauchement, le bout Supérieur de la pièce d'en bas
 passe derrière le bout inférieur de la pièce d'en haut. le chevauchement est
 de 23 lignes, dont une des pièces anti-apie sur l'autre. le bout Sup
 de la pièce d'en bas est arrondi ferme il se perd en s'amenuisant contre
 la face postérieure du bout inférieur de la pièce Supérieure. le
 bout inférieur de la pièce Supérieure est en muscle de Carpe
 s'élève d'une ligne sur la face antérieure de la pièce d'en bas. Sans
 porter a fauf

Le Calus a 23 lignes de long. il est bien plus solide que celui des deux
 observations précédentes, dans l'une desquelles il n'a que 13, et dans l'autre
 15. Ce qui montre que le chevauchement est la cause qui procure au membre
 plus de longueur redonne les Calus les plus solides. mais pour que le chevauchement
 donne un bon Calus bien solide il ne faut pas que les bouts de
 os portent a fauf comme dans l'observation 2 et c'est une raison pour
 comprimer le bandage sur cette extrémité des os aladate ou l'inflammation
 est passée

est passée, et a elle ou les bouts de l'os en est au ramollissement qui précède l'induration du cal qui tombe aussitôt vers le vingt du traitement. il n'y a point encore ici de cal de ponche en haut, mais il y en a un en bas, entre les deux pièces, et dans le cal de ponche, est un vaste trou, ou j'apporte un ~~fil~~ stilet de bas en haut à la profondeur de 6 lignes, un autre le ou d'environ 2 lignes de diamètre termine l'extrémité d'en bas de la pièce supérieure. le 1^{er} pénétre dans la substance du cal le 2^d dans le canal de la moelle de la pièce supérieure à l'extrémité du cal supérieurement et inférieurement et du côté interne, est encore un large trou qui pénétre dans le cal à la profondeur de 16 lignes, le reste de l'os est lisse, très compacte luisant et d'un gris un peu plus blanc que le reste de l'os. Cette fracture avoit été faite en travers

fracture en travers

rupture de artères

Cas ou le paresthésie

des sens est plus

considérable

quand la fracture du fémur est à la partie moyenne inférieure, communément elle rompt le canal osseux situé à la partie postérieure de l'os et par ou entre l'artère qui se rend dans l'artère de la moelle. Ce qui donne lieu à plus d'épanchement de sang. quand au contraire elle est à la partie moyenne supérieure elle répond ordinairement au trajet du conduit supérieur du fémur par ou entre l'artère qui va supérieurement au canal de la moelle. Ce qui donne encore lieu à plus d'épanchement de sang

4 chevauchement

fracture en travers

fémur droit, fracture à la partie moyenne inférieure, Calus chevauchement, le bout supérieur de la pièce d'en bas, passe derrière le bout inférieur de la pièce d'en haut, le chevauchement est de 26 lignes. dont une des deux pièces antérieure sur l'autre, chaque bout de l'os à l'endroit de la fracture est arrondi fermé

Calus. on remarque entre les 2 bouts fracturés de l'os l'un supérieurement qu'inférieurement un cal de ponche ou fosse ovale ou longue et plusieurs grands trous ce sont les artères hurs de quelques conduits par ou passent des vaisseaux qui vont au Calus



Calus a l'extremite inferieure de la piece d'en haut est un
vaste trou ou conduit qui penetre d'environ un pouce dans
la piece d'en haut sans cependant atteindre jusqu'au canal
de la moelle de cette piece.

J'ai coupe le Calus sur sa longueur, entre le canal de la
moelle est fermé dans les deux pieces, aucun d'un seul canal
de la moelle distribué dans toute la longueur de la piece il y en
a maintenant deux, un pour la piece d'en haut, l'autre pour
la piece d'en bas. Celui de la piece d'en bas monte jusqu'au bout
superieur de la piece et n'est fermé que par une lame
offuse compacte épaisse d'environ une demie ligne.

Celui de la piece d'en haut est fermé par une lame
du Calus. Le Calus interposé entre les deux pieces est la lame
A B qui borne le canal inferieur du cote du Calus
est fort épaisse et fort solide. Celle C D qui le borne
posterieurement est moins épaisse de moitié que la
precedante. Celle qui borne le canal de la piece sup-
erieure et en devant est épaisse et compacte d'E
en F. Celle qui borne le meme canal de la piece
superieure par derriere G H n'est compacte que
dans une partie de la longueur
de la piece. tout le reste
est moins compacte moins
blanc, moins luisant,
mais gris mais
porreux mais parsemé
de conduits ou passeroirs
de vaisseaux et
forme le Cal.

a l'ote interne de la piece — D
d'en haut vis a vis du Cal et en dehors sur la longueur de la
est une gouttiere creusée allongée sur le os qu'on
il a

il a été ramoli. elle y a été creusée par la compression forte qui a faite le murde vaste interne qui dont l'action n'a point été assez amortie pendant le traitement par le bandage. du côté tout à fait interne de cette pièce est une épine osseuse qui avoit autre plus affaiblie si le bandage alogue du ramollissement du lalus avoit été comprimé plus soigneusement

tem, ou il convient de comprimer le bandage et pour quoi

il y a une remarque a faire par rapport au lalus du ² des fractures femur avec chevauchement. C'est que la piece d'en haut qui passe devant elle d'en bas, naturellement angulaire à la face postérieure, quand elle est saine, comme à propos par cette partie angulaire, ^{au 1^{er} moment du chevauchement} contre la partie ~~arrondie~~ et antérieure de la piece d'en bas qui est arrondie, dou il suit quelle ni touche pour ainsi dire que par une ligne ^{forte et nette} et quelle que cette espèce de fracture, sujette à cet espèce de déplacement dans les adultes



abaissement a plus besoin par cette raison particulière de se contenter dans les premiers moments.

mais par la suite ce qui est digne de remarque c'est que malgré l'étroitesse de les contacts, dans les premiers moments, les chocs ^{huralement} changent en ce que les contacts deviennent plus étendus. communément la piece supérieure surtout devient plus large par en bas son ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰

67
mais seulement en bas-elles deus et sur les cotes y remplissent
vides qui pourroient ressembler de la forme presque cylindriques
de ces deux pieces chevauchantes.

il n'a point. Les 3 dernieres femurs ou les fractures sont
aux parties moyennes inferieures, ne sont point arqués ala
partie laterale interne comme celui de la 1^{re} observation
ou la fracture est ala partie moyenne superieure.

5^e chevauchement. femur ^{droit} gauche d'un poulet, fracturé en travers à la
fracture en travers partie moyenne inferieure; Calus, chevauchement, le bout
superieur delapicee d'en bas, passe un peu derriere le bout inferieur
delapicee d'en haut, non seulement il chevauche avec elle
le bout inferieur delapicee d'en haut mais encore il le
^{2^e considérablement} ~~deborde~~ du cote ~~interne~~ externe en même tems
les deux tendons sont diviges du cote interne le chevauchement
est de 6 lignes.

et le Calus est de toute cette étendue, les deux bouts fracturés
de cet os sont fermés et plutôt aplatis quarrondis, un peu gonflés
quelques lignes au dessus de leurs extremités il n'a point de fossette
au dessus du cal superieurement mais il y en a une inferieurement
dans le fond de laquelle on remarque un trou. Dailieu
le Calus est liste luisant d'un blanc gris comme le reste
du Corps de cet os. il n'enveloppe point les deux bouts de
l'os cassé il est seulement interposé entre-eux un peu
par dessus et un peu par les cotes par les quels ils se
touchent cet os a raison de la ~~dysplasie~~ ^{2^e ou environ} chevauchement
laterale a 10 lignes de largeur vis a vis du calus au lieu de 4¹/₂ qu'il
a ordinairement. voila ce que la nature abandonnée à elle même
a pu faire

à parfaire il s'est fait un Calus, les bouts des os se sont bouetés le
chevauchement est tel que le bas de l'apice d'en haut grappe un peu
devant le bout supérieur de l'apice d'en bas. mais faute de secours
les pièces n'ont point été replacées continues, il en est résulté
ce que les condyles ont été dirigés en dedans, ce qui a porté du
côté externe le bout supérieur de l'apice inférieure fait
un espèce de déplacement de côté avec chevauchement l'un
la difformité plus large. d'plus les bouts des os n'ont point
été arrondis mais aplatis comme on l'adit il sembleroit qu'un
bandage auroit dû borner cet aplatissement s'il eût été
posé après sur l'extrémité de l'os au moment du
ramollissement pour donner au Cal une forme avantageuse
effaler le tranchant qu'on remarque au bas de la
pièces inférieures faire rentrer les deux pièces l'une sous
l'autre appliquer leurs bouts l'un contre l'autre

en abandonnant dans le animal le femur fracturé
au gré de la nature jusqu'à près la guérison du Calus
on voit ce que la nature opère pour la réparation
examinant les femurs humains fracturés et résoudés
dans leupa qui on a administrés les secours de l'art on voit
ce que l'art ajoute à la nature ce qui est de la nature
ce qui est de l'art. l'état présent de l'art et ce qu'il laisse
à désirer.

6 Chevauchement, femur droit d'un poulet fracturé obliquement,
fracture oblique à la partie plus que moyenne inférieure, Calus chevauchement
le bout supérieur de l'apice d'en bas est séparé de l'apice d'en
haut, se porte en dehors du côté externe, la portion inférieure
de l'apice

le Cal n'est
pas toujours
aussi long que
le chevauchement

de la picee Denbas qui repond au Condyle interne et au
devant de la gouttiere du femur posterieure et un peu au
Cote externe du bout inferieur de la picee superieure. Le
chevauchement est de 16 lignes et le Cal de 9. La picee denbas
fourche superieurement avec le corps de celle den haut. Celle
denbas depuis la separation avec elle den haut son va en
pointe est fermee dans toute sa longueur et terminee a son
sommet par une petite tete. L'extremite inferieure
de la picee den haut est irreguliere un peu applatie et
descend plus bas de 13 lignes que le Condyle interne.
anterieurement a le Condyle. j'ai dit que le chevauchement
etait de 16 lignes et le Cal de 9. Cela vient de ce que dans cette
fracture qui est oblique les os ont presque l'un sur l'autre.

Calus. il ne passe point autour des deux os en visole, le
bas de la picee denbas est gonfle et plus blanc vis a vis du Calus
que dans le reste de son etendue. Le Calus se fait entre les deux
pices davantage a ce qu'il parait au dessus de la superieure
qui semble toujours que de l'inferieure il y a quelques os entre
elles en devant quelques trosses entre elles en arriere il n'a
point encore pris la solidite.

il eut fallu appliquer les extremités fourchantes des
os contre le corps respectif. faire que la picee denbas ne
disparait pas la cicatrisation. mais cela eut ete impossible par
rapport a la fourche den haut qui etait engagee dans le char
moins qu'après l'en avoir degage par des extensions ou par une
incision au moyen de laquelle on eut coupe ce qui longuait
de l'appliquer contre le corps de la superieure. pour le bout inferieur
il m'a voit que les extensions et les contractions qui eussent pu
la remonter n'estoient pas suffisantes a la contention.

fracture oblique
chevauchement, femur droit d'un poulet, fracture oblique, Palus ebauché,
chevauchement. le bout supérieur de la piece d'en bas, passe derrière le
bout inférieur de la piece d'en haut. les deux bouts de l'os alendroient
de la fracture et fort au dessus et au dessous sont gonflés raboteux
rugueux, troués. les deux pieces sont disjointes mais appliquées l'une
contre l'autre dans toute l'étendue du biseau de la fracture
oblique et les faces qui se rapportent l'une rive arrête comme
dans les fractures velantes mais raboteux et se modelant l'une
sur l'autre. le chevauchement n'est que de 5 lignes

fracture de l'os
gauche en fait des
bouts de la partie moyenne
sans qu'il y ait de
la lésion de la partie
supérieure de 2 lignes
que la droite. les deux
vaut de l'os d'en haut
fracture de l'os
de la partie inférieure
le mal n'est
chevauchement
voies en l'os
du fémur prox 10

Calus. c'est en train de se former. le cal rugueux des bouts de l'os
alendroient de la fracture, le gonflement les trous qui li remar-
quent et que l'os ne découvre point dans le même os quand
il est sain et non fracturé montre bien tout le travail de la
nature dans le bout même des os cassés pour les amener à se
soudes; le jeuque ou en est le Cal il y a deux trous de chaque
bout des os qui percent dans le canal de la moelle.
fractures de la jambe



I fracture oblique du tibia à la partie moyenne inférieure
je n'ai que le tibia, je ne sais le qui est arrivé ou le qui n'est point
arrivé au péroné. le bout supérieur de la piece inférieure passe
derrière le bout inférieur de la piece supérieure.

Calus. le Cal est oblique comme la fracture, il a 2 trous et
demi de long, il est très compacte et très uni sur toutes les faces
de l'os et à toutes les crêtes il fait un resaut de 4 lignes à l'extrémité
inférieure de la piece d'en haut, un moins saillant à
l'extrémité supérieure de la piece d'en bas, il y a face externe
un vaste trou qui perce dans le canal de la moelle. c'est le seul
que l'on remarque dans toute l'étendue de le Cal. Il est vrai
s'il étoit vrai que le Calus soit plus solide que le reste de l'os on
pourrait

trous du tibia
celui qui est de l'inf-
érieur de celui
qui est de la face
supérieure
et qui descend

pourroit dire que les Calus obliques par le quel sont plus longs
sont les plus solides. ^{je trouve dans les os adhérences par les parties plus que moyenne}
Le paroit que les Calus les plus solides, sont ceux en qui toutes
choses égales d'ailleurs les os sont soudés dans une plus grande
étendue de leur surface.

2 fractures en travers oblique du tibia, du perone, chevauchement, et
fracture en long d'une partie du tibia, Calus.

tibia. l'extrémité supérieure de l'apice inférieure passe
derrière l'extrémité inférieure de l'apice supérieure; le bec
ou la pointe sup de l'apice inférieure se trouve en arrière
avec le corps de l'apice supérieure dont il se lève d'un pouce
le bec de l'apice supérieure fait saillie ^{en dedans} sur l'apice inférieure
dont il est détaché de 4 lignes. le chevauchement est de 2 pouces
9 lignes qu'il y a d'un bec de la fracture à l'autre et le Calus
de la face interne du tibia de 21 lignes.

la fracture en long de le tibia est de près de 13 pouces,
elle commence à l'extrémité inférieure de l'apice de haut,
se prolonge ~~se prolonge~~ dans la face interne et dans la face
postérieure. Le pourroit être plutôt une esquille, mais
celle esquille dans l'état présent de l'os est soudée par un
Calus à la partie postérieure du corps du tibia et ensuite
séparée en fait d'avec le même os le long de la face externe
et le long de la face postérieure. par en bas elle joint une
pointe qui porte à faux, arrondie à l'ordinaire et qui
chevauche de 5 à 6 lignes avec l'apice inférieure du
tibia à la quelle elle se soude en partie cette même
pièce se soude aussi avec le sommet de l'apice inférieure
du perone.

Calus composé
il y a donc des
Calus simples

le perone

le peroné. quant a la fracture du peroné que j'ai dit
oblique et avec chevauchement, l'extrémité sup de l'apice
de bas passe le long du côté interne de l'extrémité inférieure
de l'apice de haut le chevauchement est de 18 lignes et
le calus d'un peroné parce que les points de haut elle
de bas ne sont point joints au peroné mais portent à faux.
Dans cette disposition tant du tibia que du peroné
la jambe n'est point droite, mais enfoncée par devant
à l'endroit de la fracture.

quand le tibia
et le peroné sont
fracturés ils
ne sont pas
toujours l'un
vis à vis de l'autre.

Calus. il a le li de remarquable 1^o que comme la
fracture oblique ^{du} tibia finit ou commence la
fracture oblique du peroné la quelle ^{est plus basse que} ^{au tibia}
celle du tibia, de même le calus du tibia finit ou commence
le calus du peroné ^{avec le peroné} au dessus du calus du peroné.
2^o l'apice détachée du tibia par en bas se joint avec le
tibia supérieurement, avec le tibia ~~supérieurement~~ ^{supérieurement}, avec
le tibia inférieurement et avec le peroné inférieurement le
qui fait déjà un Calus Complet. Car il y a des Calus Complets
3^o lors les points ou bords tant du tibia que de la
fractures tant du tibia que du peroné qui portent à faux
sont arrondis, la partie de l'os qui repose au lateral de la
moelle est ou remplie ou en partie remplie de la
substance du cal.

4^o le quel y a de cal formé du côté interne tant au
tibia que au peroné est solide et sans trou et uni. le
quel y en a du côté externe et à la face postérieure offus
de grands trous ou fentes qui pénètrent dans le canal
de la moelle

Cette observation montre qu'il faut en pareils cas lors de la réduction et de l'application du bandage donner des soins particuliers à la fracture du tibia qui est en haut et à la fracture du péroné qui est plus basse. à laquelle délaçée de l'extrémité inférieure de la pièce supérieure du tibia et qui chevauche par en bas et par derrière sur le dos d'un os sur la partie non fracturée de l'extrémité supérieure de la pièce inférieure du tibia.

il est de principes par rapport aux esquilles

1^o de les laisser quand elles tiennent, quand elles ne causent point de douleurs d'accident, et qu'elles ne portent aucun obstacle au traitement

2^o de les rapprocher contre les plus juste qu'il se peut afin que le cal prenne plus de solidité et qu'il offre moins de difformité

3^o non seulement de rapprocher les esquilles contre les mais encore le côté fracturé de l'esquille contre le côté de la pièce opposée comme dans le cas présent. Ce qui empêche la coaptation juste de l'esquille avec le corps de la pièce dont elle est détachée.

Cela posé et dans le cas présent tant pour diminuer le chevauchement du tibia que du péroné, que pour procurer la coaptation de l'esquille à la pièce supérieure du tibia il eût fallu faire des extensions et des contre extensions suffisantes à l'aide desquelles on eût reporté les faces fracturées

sans fractures vis à vis les uns des autres, et dégagé
 l'apophyse inférieure de laquelle Dulibia de dernière l'apophyse
 inférieure de cet os pour la rapprocher de l'apophyse supérieure
 et ensuite tenir toutes les pièces en situation et tenir
 la jambe suffisamment en extension ou même avec le bandage
 car il faut que le bandage maintienne les os en place et
 qui dans le cas et après la coaptation ne se présentent presque
 point de résilience respective. que le bandage restreigne
 l'action naturelle et morbifique des muscles il faudra
 le serrer et il sera à craindre de l'enrouler dans les
 vêtements de bandage trop serrés. voilà les os
 il faut avoir au moyen de tenir la jambe en extension
 tandis qu'elle est bandée et continuellement avec le bandage
 surtout à vers l'extériorité ou le latéral ou le supéro-externe à la
 foudre et jusqu'à ce qu'il ait pris une certaine consistance.

fractures en
 os malade

- 3 fracture entre Dulibia à l'apophyse moyenne inférieure, du
 peroné à l'apophyse moyenne supérieure de la jambe gauche
 d'une femme, affectée depuis six ans d'une douleur croissante
 surtout l'habitude du corps. Cette femme se rendit 3 semaines
 après la fracture à l'hôpital de Clermont en Auvergne
 où on lui tira beaucoup de sang et on elle perit à la suite
 d'un devoyement que rien ne put arrêter. Cette pièce ma
 été envoyée avec les détails par M. Ollion alors
 chirurgien principal de cet hôpital.

Ces d'au

Ces deux os sont malades, fort blancs, d'une grande légèreté
vermoules et très fragiles.

Tibia il est fracturé à la partie moyenne inférieure
les deux pièces sont disjointes. à celle d'en bas le canal de la
moelle est ouvert en gouttière antérieurement, la
cavité la lame osseuse qui couvre le vaisseau, et les cellules
osseuses ruinées en grande partie. l'extrémité inférieure de
l'apophyse de haut n'a point son canal fermé mais il est
rétréci.

Calus poreux
qui coule
fragile.

Calus du tibia. il avait commencé à se former mais il avait
coulé et n'étoit repandue que par endroits l'apophyse inférieure
vers le lieu de la fracture en étoit enroulée à ses faces
internes et postérieures il étoit blanc poreux friable et cassé
et élevé irrégulièrement. fort élevé sur le bas inférieur de
l'apophyse supérieure à la face externe sur laquelle il étoit
repandue dans l'étendue de plus de deux poudres. il avait
coulé aussi sur le ligament entre-osseux et étoit joint
au péroné dans toute cette étendue. à la face postérieure du
tibia vers le bas de la même pièce supérieure il y avait
un autre amas de cette substance du même également blanche
poreuse friable.

Calus Composite

Calus du péroné. j'ai dit qu'il étoit cassé à la partie
moyenne supérieure, il a deux branches à l'extrémité inférieure
de la pièce de haut l'une qui se joint au calus qui avait coulé
du tibia sur le ligament entre-osseux, l'autre qui se joint à
l'extrémité supérieure de la pièce inférieure du péroné dans
les os l'un comme l'autre à on ne sauroit guère compter du vivant
des malades

milles de la
différence Calus
dans l'os.

Des malades sur la disposition des Calus.

fractures de l'humérus

- 1 fracture de l'humérus en travers à la partie moyenne inférieure Corps du bras.
- 2 fracture oblique de la tête du col et de la partie sup de l'humérus gauche Coup de feu. prise du m. de l'os il y a quelques brillants ou cristallisations qu'il faut examiner
- 3 fracture de la tête et du col de l'humérus prises disjointes os minces et Paris d'une file de l'hôpital de la Salpêtrière qui avait un dépôt lymphatique au bras à l'endroit de la lésion
- 4 fracture en travers de l'humérus droit d'un poulx partie moyenne supérieure. la partie ^{supérieure} inférieure de l'os est remontée un peu en arrière de l'extrémité inférieure de la prise d'en haut. Celle prise d'en bas est remontée en arrière de la prise d'en haut.

Calus qui a l'os
faillite.



Calus de l'os est formé à la jonction des deux prises qui sont soudées l'une à l'autre. Le bout inférieur de la prise d'en haut passe en travers sur le bout sup de la prise d'en haut et s'avance en avant il est porré il y a une apophyse épineuse en dedans au bout sup de la prise d'en bas et toute la prise d'en bas depuis la fracture jusque vers des condyles est gorgée comme si le Calus s'étendait jusque là il est porré et par endroits forme à l'extérieur d'une lame ossée. tout à fait inférieurement vers les condyles est une fossette comme nous en avons remarqué à certains Calus de fractures du fémur avec chevauchement.

5

fracture en travers de l'humérus gauche, d'un enfant rattriqué
elle est à la partie moyenne supérieure. il n'y a point de déplacement
et on l'est très courbe et fait presque un demi cercle. Ce n'est point
dans le lieu de la plus grande courbure qu'il est cassé à cet
endroit il est cassé complètement. mais au dessus de cette
fracture de la côte de la convexité de la courbure il est encore
cassé mais incomplètement en travers j'ai soigné cette pièce
dans sa longueur

le cal qui a commencé à se former est plus avancé
à l'extérieur qu'à l'intérieur. on devoit qu'il aboutisse du côté de la
partie latérale interne ou il est gris porcelaine tandis que le
reste de l'os est jaune

9^e obs de fracture de fémur. Cette pièce est l'extrémité supérieure
chevauchement. du fémur droit d'un enfant nique. la fracture étoit
en travers et l'extrémité sup de la pièce de bas montoit
derrière l'extrémité inférieure de la pièce de haut le
chevauchement étoit de 10 lignes

le cal qui a été rompu monté à la face inférieure
et postérieure de cette pièce une delivrance par tout ou de
adhéroit à l'autre pièce elle est longue de 10 lignes large de
4 ongles blanchâtre

9^e obs. fracture de fémur ^{en travers} sur un chat avec chevauchement
articulation nouvelle.

fractures de rayon

I

fracture du rayon à la partie moyenne ^{inférieure} supérieure
en travers. le bout inférieur de la pièce sup correspond juste
au bout sup de la pièce inf les deux bouts fractures sont gonflés
le cal a cru et s'est formé inégalement il est fort saillant
à la face interne

à la face interne il n'est point ou que peu avancée à la face antérieure et à l'externe on la remarque un vuide profond entre les deux dans la direction de l'angle postérieur on observe un sillon qui traverse le cal de haut en bas le canal de l'os est fermé de part et d'autre.

peronne

fracturée en travers chevauchement pièce coupée

Calus

fractures des Cotes

j'ai un exemple de fracture de cote et est une fracture oblique bien distincte avec Cal. Cette fracture est très large de la cote le Cal est solide mais l'os se trouss sur la longueur qui est de six pouces il n'y a point de chevauchement

j'en ai deux exemples sur l'homme toutes deux sont fractures en travers les pièces fracturées sont sans déplacement. Les bouts abouties sont vers la partie moyenne sur de vraies cotes le Calus entouré les fractures il est arrondi et fait plus de saillie en dedans qu'en dehors il est composé d'un mais moins blanc et moins luisant que le reste de la cote. Intérieurement il est plein et dur d'un os de cote H

j'en ai un exemple sur le boeuf ou il est composé.

fracture des os du bassin

l'homme de l'hôpital pressé par les mon d'ane vertue et un mal. Ce timon porta l'os pubis symphyses des os pubis Cassa en travers la branche du pubis droit elle de l'ischion, dans le trou ovalaire, Cassa également en travers la branche du pubis gauche elle de l'ischion gauche dans le trou ovalaire tout cela près des canals osseux les brach de l'ischion et du pubis gauche près la symphyse toutes les apophyses obliques gauches de l'os Sacrum

2

fracture des os du bassin d'une femme jetée par les fenêtres
d'un 2^d étage. Cette femme étoit Casse Polonoise.

La brache des os pubis droit et celle des os ischio on da même
Celle furent cassés en travers. Dans le trou ovale près de la
Panté Colloïde. Los de la hanche gauche fut cassé en

travers Dans la cavité Colloïde

9^e obs de fracture du fémur Cause de chat
chevauchement
articulation nouvelle.

10^e observation de fracture du fémur, dans un riquet. Cette fracture
point de chevauchement est à la partie moyenne Sup du fémur gauche. Los est courbé
presqu'à angle droit de devant en arrière. il ne paroît pas qu'il y ait
eu de déplacement. la fracture est très un véritable. les deux pièces
sont encore séparées l'une de l'autre en devant d'environ 2 lignes
à la profondeur de la moitié de l'épaisseur des os, elles tiennent
ensemble sur les côtes et par derrière le canal de l'artère est
fermé à l'apice d'en haut et à l'écou d'en bas. bon pour être
dessiné la fracture est au lieu de la plus grande courbure los n'est point
prismatique à son corps mais cylindrique.

5 fracture de l'humérus droit Dans un riquet. elle est à la partie moyenne
supérieure. Los est courbé de dehors en dedans. vers le lieu de la
fracture les 2 pièces sont en contact la fracture est marquée par
un sillon linéaire interneur. le canal paroît se former

Dans les fractures obliques

Dans celles avec chevauchement

relais aux extensions, aux Contre extensions, et à la Coaptation ou à la conformation. p. 244.

Deffensifs. maintenant les pièces avec le bandage et la situation.

incommensurable de la fracture oblique. des fractures auxquelles a traités

le que l'est question p. 245

le que l'est que Contre extension

moyens de la faire main, les machines. p. 246

extensions et Contre extensions complètes le que l'est p. 247

incomplètes. de genre

en les Contre avec de Thibaut p.

et l'est pour faire les extensions et les Contre extensions p. 247.

Ces ou il faut de voir de la faire les extensions avant et après l'inflammation. Et lors
quelques autres et l'inflammation l'est l'est pas l'adaptement p. 248

regles pour les extensions

1. on monte la résistance des muscles p. 248. applique les moyens, au point ou l'attachent
les muscles. alors fracture et sur autres parties si les muscles y passent.

les proportionner à la longueur du déplacement. p. 249.

à la force des muscles

qu'ils portent sur les parties qui résistent

qu'ils soient faits graduellement

ne point faire de saut

ne point faire ~~extension~~ trop forte.

affaiblir la résistance des muscles

trois choses relâchent l'apertu et les muscles

la saignée

le régime humectant

les topiques relâchants

on ne point faire les extensions que le membre ne soit appuyé

quelques muscles ne soient en demi flexion p. 249

l'est point de des de jouiller de point de l'est de quelle de passe le chais l'est l'est p. 249





